



SCAN ME

Daugiau informacijos apie skiepus

selondonics.org/childrenshealth

Parengta pagal Pietryčių Londono NHS, 2023 m. rugpjūčio mėn.

Lithuanian



South East London

Vaikų sveikatos užtikrinimas
dabar ir ateityje

Kokio amžiaus vaikui reikia įprastinių skiepų?



8 savaičių

- 6 skiepai 1 vakcinoje (pirmoji dozė)
- Rotaviruso skiepas (pirmoji dozė)
- B tipo meningokoko (MenB) (pirmoji dozė)



12 savaičių

- 6 skiepai 1 vakcinoje (antroji dozė)
- Rotaviruso skiepas (antroji dozė)
- Pneumokokinis (PCV) skiepas



16 savaičių

- 6 skiepai 1 vakcinoje (trečioji dozė)
- B tipo meningokoko (MenB) (antroji dozė)



Vienerių metų

- B tipo Haemophilus influenzae infekcijos (Hib) ir C tipo meningokoko (MenC)
- Raudonukės, tymų ir kiaulytės vakcina (MMR) (pirmoji dozė)
- Pneumokokinis (PCV) skiepas (antroji dozė)
- B tipo meningokoko (MenB) (trečioji dozė)



18 mėnesių

- MMR (antroji dozė) vaikams, gyvenantiems daugumoje pietryčių Londono rajonų Londono rajonai



2-16 metų

- Skiepai nuo gripo (kiekvienais metais)



3 metų ir 4 mėnesių

- 4 viename (ikimokyklinio ugdymo sustiprinamoji dozė)



12-13 metų

- ŽPV skiepai



14 metų

- 3 viename (paauglių sustiprinamoji dozė)
- Meningito ir septicemijos: A, C, W ir Y (MenACWY)