



টিকা সম্পর্কে আরও তথ্য

selondonics.org/childrenshealth

NHS সাউথ ইস্ট লন্ডন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, July 2025-এ হালনাগাদকৃত

Bengali


South East London

আপনার সন্তানদের স্বাস্থ্য বর্তমানে এবং
ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করতে সাহায্য করুন

আমার সন্তানের কোন বয়স থেকে নিয়মিত টিকার প্রয়োজন?



8 সপ্তাহ

- 6 ইন 1 টিকা (1ম ডোজ)
- রোটাইনাইরাস টিকা (1ম ডোজ)
- MenB টিকা (1ম ডোজ)



12 সপ্তাহ

- 6 ইন 1 টিকা (2য় ডোজ)
- রোটাইনাইরাস টিকা (2য় ডোজ)
- MenB টিকা (2য় ডোজ)



16 সপ্তাহ

- 6 ইন 1 টিকা (3য় ডোজ)
- নিউমোকোকাল (PCV) টিকা (1ম ডোজ)



1 বছর

- এমএমআর টিকা (1ম ডোজ)
- নিউমোকোকাল (PCV) টিকা (2য় ডোজ)
- মেনবি টিকা (3য় ডোজ)



18 মাস

- MMR টিকা (2য় ডোজ)
- 6 ইন 1 টিকা (জানুয়ারি 2026 থেকে)



16-2 বছর

- ফ্লু টিকা (প্রতি বছর)



3 বছর ও 4 মাস

- 4 ইন 1 টিকা (প্রি-স্কুল বুস্টার)



13-12 বছর

- HPV টিকা



14 বছর

- 3 ইন 1 টিকা (টিনএজ বুস্টার)
- MenACWY টিকা