



स्क्रान गर्नुहोस्

खोपबारे थप जानकारी

selondonics.org/childrenshealth

एनएचएस साउथ इस्ट लन्डनद्वारा निर्मित, जुलाई २०२५ मा अद्यावधिक गरिएको

Nepalese

NHS

South East London

आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यलाई अहिले र
भविष्यको लागि पनि जोगाउन मद्दत गर्नुहोस्।

मेरो बच्चालाई कुन उमेरमा नियमित खोपहरू चाहिन्छ?



८ हप्ता

- ६ इन १ खोप (पहिलो मात्रा)
- रेटाभाइरस खोप (पहिलो मात्रा)
- मेन बी खोप (पहिलो मात्रा)



१२ हप्ता

- ६ इन १ खोप (दोस्रो मात्रा)
- रेटाभाइरस खोप (दोस्रो मात्रा)
- मेन बी खोप (दोस्रो मात्रा)



१६ हप्ता

- ६ इन १ खोप (तेस्रो मात्रा)
- न्युमोकोकल (पीसीभी) खोप (पहिलो मात्रा)



१ वर्ष

- एमएमआर खोप (पहिलो मात्रा)
- न्युमोकोकल (पीसीभी) खोप (दोस्रो मात्रा)
- मेन बी खोप (तेस्रो मात्रा)



१८ महिना

- एमएमआर खोप (दोस्रो मात्रा)
- ६ इन १ खोप (जनवरी २०२६ देखि)



२-१६ वर्ष

- फ्लु खोप (हरेक वर्ष)



३ वर्ष र ४ महिना

- ४ इन १ खोप (विद्यालय पूर्व बुस्टर)



१२-१३ वर्ष

- एचपीभी खोप



१४ वर्ष

- ३ इन १ खोप (किशोरावस्था बुस्टर)
- मेन एसडीडब्ल्यूवाई खोप